

Comparación de riesgos de Covid-19 en adolescentes (5-11 años)

No vacunado

jóvenes (5-11 años)


Riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte por COVID-19.



Riesgo de "COVID persistente" - una amplia gama de problemas de salud nuevos/continuos que comienza aproximadamente 4-5 semanas después de la infección por COVID-19.



Riesgo de síndrome inflamatorio multi-sistémico en niños (MIS) causado por COVID-19.



Fiebre MÁS 1+ de lo siguiente:

- Dolor de estómago
- Ojos enrojecidos
- Diarrea
- Mareos o aturdimiento
- Erupción en la piel
- Vómito

vs

Vacunado

jóvenes (5-11 años)

Los efectos secundarios de la vacuna leves y puede que incluyan:

- malestar
- cansancio
- dolor de cabeza
- escalofríos
- náuseas
- vómitos
- fiebre



Es posible que tu niño tenga que ausentarse de la escuela por uno o dos días para recuperarse de estos efectos secundarios.

Millones de jóvenes (5-11 años) han sido vacunados de manera segura

1.4 MILLONES

40 % California


9.9 MILLONES

35 % United States



Data as of 5/4/22

Elegir no vacunar a los adolescentes contra el COVID-19 es la opción más arriesgada.



 **Vaccinate ALL 58**

¿LISTO PARA VACUNARTE?

Visita myturn.ca.gov para encontrar el centro de vacunación más cercano o llama al 1 (833) 422-4255.